zoetis

DECTOMAX®

USO VETERINÁRIO
Solução Injetável a 1% a base de Doramectina

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS E OVINOS:
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 35 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.
SUÍNOS:
O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamento, semi-confinamento e em regime extensivo na fase de terminação.

Características do Produto:
Dectomax® é um parasiticida injetável de amplo espectro para bovinos, suínos e ovinos. Uma injeção de pequeno volume controla eficazmente uma ampla variedade de vermes redondos e artrópodes que comprometem a saúde e a produtividade dos bovinos, suínos e ovinos. Dectomax® possui ampla margem de segurança, é excepcionalmente bem tolerado e fácil de aplicar, tornando-se particularmente adequado para o controle dos parasitos dos bovinos, suínos e ovinos.

Descrição do Produto:
Dectomax® contém Doramectina, princípio ativo derivado da fermentação de uma cepa geneticamente alterada de *Streptomyces avermitilis*. Doramectina é uma molécula pertencente à classe das avermectinas, com alta atividade e amplo espectro antiparasitário. Dectomax® é uma solução estéril pronta para uso, de cor amarelo-pálido, contendo 1% de Doramectina. É formulado para proporcionar as dosagens recomendadas de 200 mcg/kg de peso, quando aplicado em injeção intramuscular ou subcutânea na proporção de 1 mL/50 kg de peso para bovinos, de 300 mcg/kg de peso, quando aplicado em injeção intramuscular na proporção de 1 mL/33kg de peso para suínos e de 200 mcg/kg de peso, quando aplicado por via intramuscular ou subcutânea na proporção de 1 mL/50 kg de peso contra nematódeos gastrintestinais e miíases (berne e bicheiras) para ovinos e de 300 mcg/kg de peso quando aplicado por via intramuscular ou subcutânea na proporção de 1 mL/33 kg de peso contra ácaros da sarna em ovinos.

Modo de ação:
O modo de ação primário das avermectinas, família de compostos a qual pertence Doramectina, consiste em alterar a atividade de troca de íons cloro no sistema nervoso dos nematódeos e artrópodes. As avermectinas bloqueiam os receptores que aumentam a permeabilidade da membrana aos íons cloro. Isto inibe a atividade elétrica das células nervosas dos nematódeos e das células musculares dos artrópodes, causando paralisia e morte dos parasitos.
Nos mamíferos, os receptores nervosos sensíveis às avermectinas encontram-se no interior do sistema nervoso central. Como Doramectina praticamente não penetra no sistema nervoso central dos mamíferos, sua margem de segurança em animais é muito grande, quando usada conforme as recomendações.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Doramectina ..... 1,00 g
Veículo ..... q.s.p. ..... 100,00 mL

Indicações:
Bovinos:
Dectomax® é indicado para o tratamento e controle das parasitoses causadas por nematódeos gastrintestinais e pulmonares, miíases (bicheiras), carrapatos, bernes, piolhos, ácaros da sarna e como auxiliar no controle da população da mosca-dos-chifres dos bovinos, conforme especificações a seguir:

Nematódeos gastrintestinais (adultos e larvas de quarto estágio):
- *Ostertagia ostertagi* (inclusive larvas inibidas)
- *Cooperia pectinata**
- *Haemonchus* spp
- *Cooperia punctata*
- *Haemonchus contortus**
- *Cooperia* spp
- *Haemonchus similis**
- *Bunostomum phlebotomum**
- *Trichostrongylus axei*
- *Strongyloides papillosus**
- *Trichostrongylus longispicularis**
- *Oesophagostomum radiatum*
- *Trichostrongylus colubriformis*
- *Trichuris* spp*

* (adultos)

Nematódeos pulmonares (adultos e larvas de quarto estágio):
- *Dictyocaulus viviparus*

Piolhos:
- *Linognathus vituli*
- *Haematopinus eurysternus*
- *Solenopotes capillatus*

Bernes:
- *Dermatobia hominis*

Ácaros da sarna:
- *Psoroptes bovis*

Miíases (bicheiras):
- *Cochliomyia hominivorax*

Carrapatos:
- *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*

Dectomax® também pode ser utilizado como auxiliar no controle de:

Piolho mastigador:
- *Damalinia bovis*

Mosca-dos-chifres:
- *Haematobia irritans*

Suínos:
Dectomax® é indicado para o tratamento e controle das parasitoses causadas por nematódeos gastrintestinais, pulmonares e renais, piolhos e ácaros da sarna dos suínos, conforme especificações a seguir:

Nematódeos gastrintestinais (adultos e larvas de quarto estágio):
- *Hyostrongylus rubidus*
- *Oesophagostomum dentatum*
- *Ascaris suum*
- *Oesophagostomum quadrispinulatum*
- *Strongyloides ransomi**
- *Trichuris suis*

* (adultos)

Nematódeos pulmonares (adultos):
- *Metastrongylus* spp

Nematódeos renais (adultos):
- *Stephanurus dentatus*

Piolhos sugadores
- *Haematopinus suis*

Ácaros da sarna:
- *Sarcoptes scabiei*

Ovinos:
Dectomax® é indicado para o tratamento e controle de parasitoses causadas por nematódeos gastrintestinais, miíases (bicheiras), bernes (bicho da cabeça) e ácaros da sarna, conforme especificações a seguir:

Nematódeos gastrintestinais (adultos):
- *Haemonchus contortus*
- *Cooperia oncophora*
- *Trichostrongylus axei*
- *Cooperia punctata*
- *Trichostrongylus colubriformis*
- *Nematodirus spathiger*
- *Ostertagia ostertagi*
- *Oesophagostomum venulosum*
- *Ostertagia circumcincta*
- *Trichuris ovis*

Miíases (bicheiras)
- *Cochliomyia hominivorax*

Ácaros da sarna
- *Psoroptes ovis*

Bicho da cabeça (berne)
- *Oestrus ovis*

Os níveis plasmáticos de Doramectina proporcionam eficácia duradoura contra endo e ectoparasitos dos bovinos, suínos e ovinos.

Dosagens:
Bovinos:
Aplicar Dectomax® pela via subcutânea ou intramuscular na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso (200 mcg de Doramectina por kg). Utilize a tabela abaixo como referência:

Peso (Kg)	Dose (mL)	Peso (Kg)	Dose (mL)
Até 50	1	301 – 350	7
51 – 100	2	351 – 400	8
101 – 150	3	401 – 450	9
151 – 200	4	451 – 500	10
201 – 250	5	501 – 550	11
251 – 300	6	551 – 600	12

Suínos:
Aplicar Dectomax® pela via intramuscular na dose de 1 mL para cada 33 kg de peso (300 mcg de Doramectina por kg).
Utilize a tabela abaixo como referência:


Peso (Kg)	Dose (mL)	Peso (Kg)	Dose (mL)
Até 33	1,0	67 – 82	2,5
34 – 50	1,5	83 – 99	3,0
51 – 66	2,0		

Ovinos:
Aplicar Dectomax® pela via subcutânea ou intramuscular na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso (200 mcg de Doramectina por kg) contra nematódeos gastrintestinais, miíases (bicheiras) e bicho da cabeça (berne) e de 1 mL para cada 33 kg de peso (300 mcg de Doramectina por kg) contra ácaros da sarna.


Administração:
Bovinos:
Dectomax® pode ser aplicado por via subcutânea ou intramuscular na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso (200 mcg de Doramectina por kg). Injetar o produto nas áreas de pele solta do pescoço, na frente ou atrás da paleta ou no músculo do pescoço (ver o desenho abaixo). Utilizar agulha de calibre 16 e comprimento de 15 a 20 mm. Usar equipamento estéril e seguir procedimentos de assepsia.



Suínos:
Dectomax® deve ser aplicado pela via intramuscular na dose de 1 mL para cada 33 kg de peso (300 mcg de Doramectina por kg). Os animais deverão ser muito bem contidos para assegurar a aplicação da dosagem indicada. Usar equipamento estéril e seguir procedimentos de assepsia. Utilizar agulha de calibre 18 a 20 e comprimento de 35 mm.



Ovinos:
Aplicar Dectomax® pela via intramuscular ou subcutânea na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso (200 mcg de Doramectina por kg), contra nematódeos gastrintestinais, miíases (bicheiras) e berne (bicho da cabeça) e de 1 mL para cada 33 kg de peso (equivalente a 300 mcg de Doramectina por kg) contra ácaros da sarna. Utilizar agulha de calibre 10 e comprimento 25 mm. Usar equipamento estéril e seguir procedimentos de assepsia.



Vantagens do Produto:
Amplo espectro: Dectomax® possui amplo espectro de ação contra nematódeos gastrintestinais, vermes pulmonares, bernes, miíases (bicheiras), piolhos, sarnas, carrapatos e como auxiliar no controle da população da mosca-dos-chifres dos bovinos. Em suínos tem ação contra nematódeos gastrintestinais, vermes pulmonares e renais, piolhos e ácaros da sarna.
Em ovinos tem ação contra nematódeos gastrintestinais, miíases, bicho da cabeça e ácaros da sarna.
Baixo volume de injeção.
Boa seringabilidade.
Fácil de aplicar.

Segurança:
Ampla margem de segurança inclusive para animais de reprodução, vacas, porcas e ovelhas prenhes, e bezerros, leitões e cordeiros recém-nascidos.

Compatibilidade:
Dectomax® não interfere com vacinações nas práticas de manejo veterinário.
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.
Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade do produto: 36 meses após a data de fabricação.

Apresentação: Frasco ampola de vidro âmbar contendo 20, 50, 100, 250 e 500 mL.

Responsável Técnica: Vanessa da Silva Lopes CRMV SP nº 28.204
Licenciado pelo MAPA desde 14/08/1992. Registrado no SIPEAGRO sob o nº SP 000072-8.000034.
Fabricante: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. Camprodon s/n «La Riba»
17813 Vall de Bianya - Gerona, Espanha
Proprietário: Zoetis Inc.
333 Portage Street
Kalamazoo, MI 49007 EUA
Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:
Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1.701
CEP 13064-798 – Campinas - SP
CNPJ: 43.588.045/0001-31
SAC 0800 011 1919
PRODUTO IMPORTADO

40038567