Ripercol® L - 150F

Anti-helmíntico e imunoestimulante inespecífico para bovinos à base de fosfato de levamisol 18,8%

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS:
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 7 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 2 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Fosfato de Levamisol ..... 18,8 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Injetável por via subcutânea.

Ripercol® L - 150F destina-se ao tratamento das verminoses gastrintestinais e pulmonares de bovinos.

Indicações:
Ripercol® L - 150F controla todos os helmintos de importância econômica na criação de bovinos: *Haemonchus* spp., *Cooperia* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum phlebotomum, Neoascaris vitulorum, Oesophagostomum radiatum, Chabertia* spp. e *Dictyocaulus viviparus* (verme do pulmão).
Ripercol® L - 150F, quando aplicado após as vacinações rotineiras, tem efeito imunoestimulante inespecífico.


Modo de Usar:
Ripercol® L - 150F deve ser aplicado em injeções subcutâneas, de preferência na região posterior ou anterior à escápula (pá). Não se deve aplicar este ou qualquer outro produto injetável sobre a pá ou costelas dos bovinos. Em condições climáticas ou de manejo que favoreçam as infestações, a critério do médico veterinário, pode-se repetir o tratamento 3 a 4 semanas após a primeira aplicação.

Administração:
Agulhas e seringas, antes do uso, devem ser submetidas aos processos de esterilização normais. O local de injeção, no animal, deve ser previamente desinfetado com algodão embebido em álcool iodado ou semelhante. Recomenda-se subdividir a dose em locais diferentes, no caso de volumes superiores a 10 mL.

Doses:
Aplicar 1 mL de **Ripercol® L - 150F** para cada 40 kg de peso corporal. Nos casos de infestações altas por *Trichostrongylus axei* e *Ostertagia* spp., recomenda-se dobrar a dose, ou seja, 2 mL para cada 40 kg de peso corporal.

Para orientação, veja a tabela abaixo:

Peso do bovino	Dose de Ripercol® L - 150F
41 a 80 kg	2 mL
81 a 120 kg	3 mL
121 a 160 kg	4 mL
161 a 200 kg	5 mL
201 a 240 kg	6 mL
241 kg em diante	1 mL para cada 40 kg de peso vivo



LOCAL CORRETO DE APLICAÇÃO

Doses superiores a 10 mL devem ser subdivididas e aplicadas em locais diferentes.

Cuidados:
- Não submeter os animais a exercícios prolongados antes ou depois do tratamento.
- Seringas e agulhas devem ser esterilizadas antes do uso.
- O local de aplicação deve ser desinfetado com álcool iodado ou produto similar.
- Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.
- Produtos injetáveis podem ocasionar raros casos de reações de hipersensibilidade individual. O grau dessas reações depende da sensibilidade de cada animal tratado.
- Em animais jovens, evitar sobredose e naqueles debilitados por problemas infecciosos e/ou nutricionais, recomenda-se o tratamento destes problemas antes da aplicação de qualquer antiparasitário.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Armazenamento: Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar.