

E.C.P.[®]

(Cipionato de Estradiol)

Solução Estétil

2 mg/mL

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS: ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE RETIRADA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.
LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE RETIRADA PARA O CONSUMO DE LEITE DOS BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

USO VETERINÁRIO

E.C.P.[®] (Cipionato de estradiol) é o 17 (beta) éster ciclopentilpropionato de estradiol "alfa".
Fornece estradiol-17-B, provavelmente o mais potente dos estrógenos naturais, na forma do éster ciclopentilpropionato, um derivado altamente solúvel em gordura, com profundos efeitos estrogênicos. Estudos comparativos demonstraram que o cipionato de estradiol produz efeitos estrogênicos que são qualitativamente os mesmos que os produzidos por outros ésteres do estradiol. O estro é prontamente induzido, na maioria dos animais, após injeção deste preparado e mantém-se, usualmente, por um período similar à duração do estro de ocorrência normal.

Indicações na medicina veterinária

E.C.P.[®] (Cipionato de estradiol) tem um largo raio de ação na prática veterinária, porquanto oferece todas as atividades funcionais das substâncias estrógenas naturais, com a vantagem de ação mais uniforme e profunda.

As indicações na medicina veterinária incluem:

1. Indicado para sincronização de ovulação em fêmeas bovinas.

Administração e doses

E.C.P.[®] (Cipionato de Estradiol) Solução Estétil, 2 mg/mL, destina-se unicamente à administração intramuscular. A dose recomendada para sincronização de ovulação é de 0,5 mL de E.C.P.[®] por animal (equivalente a 1 mg de cipionato de estradiol por animal).

Recomenda-se que este preparado não seja empregado em nenhum animal a não ser nos acima mencionados.

NÃO EMPREGUE DOSAGEM EXCESSIVA

Estro prolongado, desenvolvimento precoce, irritação genital e redução de leite são fenômenos decorrentes de dosagem excessiva, assim sendo, a dose deverá ser reduzida de acordo.
Devido ao fato de ser impossível determinar exatamente se ou quando a ovulação pode ocorrer nas fêmeas sob terapia, durante um período induzido de cio ou nos períodos subsequentes, pode ser útil que a fêmea seja acasalada repetidamente durante os períodos de cio induzido, a fim de influenciar a possibilidade de concepção.

Apresentação

E.C.P.[®] (Cipionato de estradiol) Solução Estétil é apresentado em frasco-ampola de 10 mL

contendo, cada mL: cipionato de estradiol 2 mg, clorobutanol 5 mg e óleo de caroço de algodão q.s.p.

Utilize todo o conteúdo do frasco no prazo de 30 dias após a retirada da primeira dose.
Conservar em temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), em local seco e fresco ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado pelo MAPA desde 18/09/72.

Registrado no SIPEAGRO sob o nº SP-000072-8.000051.

Proprietário:

Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

R. Luiz Fernando Rodriguez, 1701

CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ nº 43.588.045/0001-31

SAC 0800 011 1919

Responsável Técnica: Vanessa da Silva Lopes

CRMV SP nº 28.204

Indústria Brasileira

zoetis

Fabricante:

Ourofino Saúde Animal Ltda.

Rodovia Anhanguera, SP 330, km 298

Distrito Industrial - Cravinhos - SP

CEP 14140-000

CNPJ nº 57.624.462/0001-05

50006650/0125 2000