CYDECTIN®

USO VETERINÁRIO

Solução Injetável de Moxidectina à 1%

Endectocida para uso no tratamento e controle de parasitos internos e externos de bovinos.

Cydectin® é uma solução estéril injetável à 1% de Moxidectina, um novo e poderoso endectocida. A Moxidectina é obtida a partir da modificação química da Nemadectina, um produto de fermentação do microrganismo *Streptomyces cyaneogriseus* subsp *noncyanogenus.*
Quando administrado na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, **Cydectin®** formulação injetável à 1%, é eficaz para o tratamento e controle de parasitos internos e externos dos bovinos.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Moxidectina ..... 1 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Indicações:
Cydectin®, administrado na dose recomendada, promove o tratamento e controle dos seguintes parasitos internos e externos de bovinos:

Parasitos gastrintestinais: (estágios adultos e imaturos)
Ostertagia ostertagi (incluindo seu estágio hipobiótico);
Ostertagia lyrata;
Haemonchus placei;
Trichostrongylus axei;
Trichostrongylus colubriformis;
Cooperia punctata;
Cooperia pectinata;
Cooperia oncophora;
Cooperia spatulata;
Oesophagostomun radiatum;
Nematodirus spathiger;
Bunostomum phlebotomum;
Trichuris discolor

Verme Pulmonar: *Dictyocaulus viviparus*

Cydectin®, na mesma dose recomendada, é também efetivo contra os seguintes parasitos externos:
Sarna: *Psoroptes bovis*
Piolhos: *Linognathus vituli; Haematopinus eurysternus; Solenopotes capillatus.*
Carrapato: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*
Hypoderma sp.

Administração e Dosagem:
Cydectin® deve ser aplicado por via subcutânea na frente ou atrás da escápula, na dose de 1 mL do produto para cada 50kg de peso corporal, que fornece 0,2 mg de Moxidectina por kg.
Usar agulhas de 10 a 15 mm, calibre 16.
Utilizar sempre material estéril e observar as práticas usuais de assepsia.
Recomenda-se separar os animais em grupos de acordo com o peso e usar a tabela a seguir para orientar a dose.

Peso (kg)	Dose (mL)
50	1
100	2
150	3
200	4
250	5
300	6
350	7
400	8
450	9
500	10

Local correto para aplicação



Importante: Deve ser mantida a dose de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal. Em casos de bovinos com peso acima de 500 kg, recomenda-se dividir o volume da dose, aplicando-se em locais diferentes.

Trabalhos técnicos demonstram que Moxidectina 1% p/v evita a reinfestação por larvas de *Ostertagia* spp., *Haemonchus* sp., *Oesophagostomum radiatum* e *Trichostrongylus axei,* por no mínimo 28 dias e durante 42 dias contra o verme pulmonar *Dictyocaulus viviparus.*

Segurança:
Numerosos estudos em várias condições de campo demonstram que **Cydectin®** possui ampla margem de segurança quando utilizado de acordo com as recomendações.
Produtos injetáveis podem ocasionar raros casos de hipersensibilidade individual, cujo grau depende de cada animal. Nestes casos, suspender o uso da medicação e administrar epinefrina ou equivalente.
Em animais debilitados ou afetados por enfermidades infecciosas, recomenda-se tratar antes da aplicação do antiparasitário.
Pode ser usado em touros e vacas prenhes sem efeitos negativos sobre sua atividade reprodutiva.

Cydectin® é compatível com outros produtos usados na saúde animal de bovinos, incluindo vacina antiaftosa e contra clostridioses.

Segurança Ambiental: Quando aplicado conforme recomendado, os níveis de **Cydectin®** nas fezes dos animais não apresentarão nenhum efeito adverso significativo aos adultos e às larvas do besouro *(Digitonthophagus gazella).*

Estabilidade:
Cydectin® é estável por período não inferior a 4 (quatro) anos, quando mantidas as condições de armazenamento recomendadas.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Precauções:
O produto deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC) e protegido da luz solar.
Assim como todo medicamento, **Cydectin®** deve ser armazenado fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Recomendações:
Consulte seu Veterinário para assistência no diagnóstico, tratamento e controle das enfermidades parasitárias.
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Apresentação:
Frasco ampola de plástico contendo 50 mL, 500 mL e 1000 mL.

Validade do produto: 48 meses após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 6709 em 08/02/99.

INFLAMÁVEL

zoetis

Proprietário e Fabricante:
Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701
CEP 13064-798 - Campinas - SP
CNPJ 43.588.045/0001-31
Indústria Brasileira
Responsável Técnico: Dr. Renato Beneduzzi Ferreira
CRMV-SP nº 1695
SAC 0800 011 1919

40013750 / GC-030