

ANTISEDAN®

Cloridrato de Atipamezole (5,0 mg/mL)

Agente para reversão dos efeitos da Dexmedetomidina e da Medetomidina, em cães e gatos

Solução Injetável

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada 1,0 mL contém:

Cloridrato de Atipamezole..... 5,0 mg

Veículo.....q.s.p..... 1,000 mL

INDICAÇÕES:

Antisedan é indicado para reverter os efeitos sedativos e analgésicos da medetomidina e da dexmedetomidina, em cães e gatos. Ele também reverte todos os outros efeitos da medetomidina e da dexmedetomidina, como efeitos cardiovasculares e respiratórios.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO:

As seguintes dosagens são recomendadas:

Cães: a dose ideal em microgramas por quilograma é de 5 (cinco) vezes a dose de medetomidina ou 10 (dez) vezes a dose de dexmedetomidina.

Gatos: A dose ideal do produto, em microgramas por quilograma é de 2,5 (duas e meia) vezes a dose de medetomidina administrada ou 5 (cinco) vezes a dose de dexmedetomidina.

A dose em microgramas por quilograma de Antisedan não deve exceder 4 (quatro) vezes a dose previamente administrada de medetomidina ou 8 (oito) vezes a dose previamente administrada de dexmedetomidina.

MÉTODO E VIA DE APLICAÇÃO:

O produto deve ser aplicado via injeção intramuscular.

CONTRA-INDICAÇÕES:

- Não usar em cadelas e gatas prenhes;
- O uso concomitante de outras drogas com efeito sobre o sistema nervoso central, exceto às especificadas nesta bula, não é recomendado;
- Não usar Antisedan em cães, quando a combinação medetomidina e butorfanol ou dexmedetomidina e cetamina, tiverem sido utilizadas.

EFEITOS INDESEJADOS:

Cães: Efeito hipotensivo passageiro foi observado nos primeiros 10 minutos após a administração de Antisedan. Breve período de comportamento apreensivo ou excitado, vômito, respiração ofegante, defecação e tremores musculares foram observados raramente.

Gatos: Possível hipotermia (mesmo no animal já acordado), quando usadas doses baixas de Antisedan para reverter parcialmente os efeitos sedativos da medetomidina ou da dexmedetomidina.

SUPERDOSAGEM NOS ANIMAIS:

Após uma possível *overdose* de Antisedan, pode-se observar um estado de hiperexcitação e taquicardia.

A melhor maneira de lidar com a hiperexcitação em gato é minimizar estímulos externos (luz, barulho).

INTOXICAÇÃO NO HOMEM:

Devido à potente atividade farmacológica do atipamezole, recomenda-se que o contato do produto Antisedan com pele e mucosas seja evitado. Recomenda-se a utilização de luvas impermeáveis durante a manipulação e administração do produto.

No caso de contato do produto com pele ou mucosa, lavar abundantemente com água.

No caso de auto-injeção ou ingestão acidental, procurar ajuda médica imediatamente, levando consigo a bula ou embalagem do produto. Não dirigir. Não deixar o paciente sem supervisão.

Pessoas com sabida hipersensibilidade ao ativo ou qualquer dos excipientes da fórmula, devem administrar o produto com cuidado, e utilizar luvas impermeáveis ao manipulá-lo.

PRECAUÇÕES:

Antisedan pode provocar uma reversão abrupta da sedação e, presumivelmente, da analgesia. O potencial de comportamento apreensivo ou agressivo deve ser considerado no manejo de cães se recuperando da sedação, especialmente aqueles indivíduos predispostos a estes comportamentos.

Pessoas manejando cães que receberam Antisedan recentemente devem ser cautelosas, e também evitar situações onde o animal possa sofrer uma queda.

Informações sobre o uso concomitante de atipamezole e outras drogas não são completas, portanto o uso de diversas medicações deve ser exercido com cuidado. Os animais devem ser monitorados, particularmente para hipotermia persistente, bradicardia e depressão respiratória, até completa recuperação.

A administração de agentes anestésicos em animais idosos ou debilitados deve ser feita com cuidado.

Antisedan reverte os sinais clínicos associados com a sedação por medetomidina e dexmedetomidina, mas a volta fisiológica completa para o estado pré-tratamento pode não ser imediata, e deve ser monitorada.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar.

Após a retirada da primeira dose, utilizar todo o conteúdo dentro de 30 dias.

Validade do Produto: 24 meses após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO: Antisedan está disponível em frascos de vidro de 10 mL.

Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO, APLICAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.049/2015 em 16/04/2015.