

Felocell® CVR



(Vacina contra Calicivirose, Rinotraqueíte e Panleucopenia dos Felinos)

USO VETERINÁRIO

COMPOSIÇÃO: Vírus da Rinotraqueíte Felina, Vírus da Panleucopenia Felina e Calicivírus Felino

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Felocell CVR é indicada para vacinação de gatos saudáveis como auxílio na prevenção da infecção do vírus da rinotraqueíte felina, calicivírus felino e vírus da panleucopenia felina. Felocell CVR contém amostras atenuadas do vírus da rinotraqueíte felina, calicivírus felino e vírus da panleucopenia propagados em uma linhagem celular felina estabelecida, sendo apresentada sob a forma liofilizada, acompanhada de diluente estéril.

DESCRIÇÃO DA DOENÇA: *Rinotraqueíte Viral Felina (FVR)*, é causada por um herpesvírus, altamente contagiosa, sendo responsável por 40–45% das infecções respiratórias felinas. Os primeiros sinais de FVR são espirros, febre, conjuntivite, rinite e salivação.

Uma descarga nasal e ocular inicialmente serosa, que rapidamente transforma-se em mucopurulenta, é típica da doença. Como FVR progride; anorexia, depressão e pelos ásperos podem ser observados.

Embora poucos gatos adultos morram por FVR, a taxa de mortalidade entre filhotes afetados pela doença, pode chegar a 50–60%.

Considera-se que a *Calicivirose Felina (FCV)* é responsável por outros 40–45% das infecções respiratórias felinas e infecções mistas FCV-FVR não são raras. Calicivírus Felino infecta as membranas da mucosa oral e do trato respiratório e o sintoma característico desta infecção é a formação de úlceras na língua, determinadas pelo calicivírus. Outros sinais clínicos são semelhantes a FVR: anorexia, depressão, febre, salivação e descarga nasal. O calicivírus felino afeta mais severamente gatos jovens ou debilitados, mas a mortalidade total não é alta. A infecção pode potencializar outros agentes (virais ou bacterianos) de pneumonias.

Panleucopenia Felina (FPL) está entre as mais difundidas e sérias doenças dos gatos. Altamente contagiosa, a FPL é transmitida por contato direto de animais susceptíveis com animais infectados, ou indiretamente, por contato com objetos contaminados.

Sinais clínicos de FPL incluem febre, anorexia, vômitos, depressão e fraqueza; diarreia também pode ocorrer, usualmente 2–4 dias após o começo da febre. Características hematológicas incluem uma dramática diminuição das células brancas circulantes. Particularmente entre filhotes, FPL pode resultar em alta mortalidade. Gatos que sobrevivem à infecção frequentemente mantêm-se debilitados por toda a vida. Filhotes infectados “in útero” ou poucos dias após o nascimento podem sofrer danos cerebrais clinicamente manifestados por incoordenação, quando eles começam a caminhar.

SEGURANÇA E EFICÁCIA: A segurança de Felocell CVR foi demonstrada em ensaios de campo envolvendo gatos com idade entre 5 semanas a 17 anos. Reações pós-vacinais sérias atribuídas à vacina não foram reportadas.

A eficácia de Felocell CVR foi determinada por testes de imunidade-desafio. Os gatos vacinados apresentaram sinais clínicos menos severos que os gatos não vacinados, após o desafio com cepas virulentas de vírus FVR, FCV ou vírus FPL.

A eficácia da fração FPL na Felocell CVR foi posteriormente estabelecida em estudos de antigenicidade repetidos durante 3 anos. Três anos após terem sido realizados os estudos iniciais de eficácia, foram repetidos os testes de desafio de FPL. Após o desafio todos os gatos vacinados permaneceram saudáveis, enquanto que 80% dos gatos controle desenvolveram sinais clínicos de FPL. Resultados de ensaios sorológicos indicam não existir interferência, imunológica entre os antígenos vacinais. A vacinação de gatos SPF com Felocell CVR, estimulou a produção de anticorpos neutralizantes para cada antígeno viral contido na vacina.

INDICAÇÕES: Felocell CVR é indicada como auxílio na prevenção das seguintes doenças, em gatos saudáveis: rinotraqueíte, calicivirose e panleucopenia.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

- Recomenda-se a vacinação somente de gatos saudáveis.
- Reidratar a vacina liofilizada para 1 mL usando o diluente estéril que a acompanha.
- Administrar a dose de 1 mL por via intramuscular ou subcutânea.
- Utilizar técnicas assépticas ao administrar o produto.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO:

Gatos com 9 semanas de idade ou mais velhos deverão receber 2 doses de Felocell CVR, com intervalo de 3–4 semanas entre elas. Gatos com menos de 9 semanas de idade deverão receber uma dose a cada 3–4 semanas até completarem 12 semanas de idade. Revacinação anual, com dose única, é recomendada.

PRECAUÇÕES:

- Vacinação de gatos prenhes deve ser evitada.
- Armazenar o produto à temperatura entre 2°C e 8°C. Não congelar.
- Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.
- Usar todo o conteúdo do frasco imediatamente após a reidratação.
- Incinerar os frascos usados e todos os conteúdos não utilizados.
- Utilizar seringas e agulhas esterilizadas para administrar esta vacina. Não utilizar desinfetantes químicos para esterilização, pois traços dos desinfetantes podem inativar a vacina.
- Contém gentamicina como preservativo.
- Em caso de reações de anafilaxia seguinte ao uso do produto, administrar epinefrina ou equivalente.
- Embora este produto tenha se mostrado eficaz, alguns animais podem ser incapazes de produzir uma resposta imunológica eficiente após a vacinação. Isto poderá ocorrer se eles estiverem incubando alguma doença infecciosa, mal nutridos ou parasitados ou estressados por condições adversas de manejo.

Venda sob prescrição e aplicação por orientação do Médico Veterinário.

PRODUTO IMPORTADO